

Février 2013

Champignons des marges de la Double Saintongeaise

Pascal MICHEL



Gomphidius roseus avec Suillus bovinus

Sommaire du numéro 3


Entoloma vernum

Tricholoma stans

Lepiota brunneoincarnata

Xerocomus armeniacus

Marasmiellus tricolor



En bordure nord du département de la Gironde et voisin de la Charente maritime, les marges de la Double Saintongeaise s'étendent sur une quarantaine de kilomètres d'est en ouest avec une largeur variant de deux à quinze kilomètres. La forêt est bien présente sur ce territoire avec les essences habituelles de la région : *Pinus pinaster*, *Quercus robur*, *Castanea sativa*. Parsemée de nombreuses clairières cultivées elle se voit aujourd'hui de plus en plus réduite par des coupes rases mettant réellement en danger le tissu paysager en certains endroits.



Lieu d'observation de *Xerocomus armeniacus* (Moulin de Charlot)

Présentation des espèces et écologie

Entoloma vernum S.Lundell

Entolome printanier

Description macroscopique des spécimens récoltés :


Chapeau jusqu'à 4 cm, conique à convexe, mamelonné, hygrothane, brun-gris, palissant par bandes radiales.

Lames grises devenant rosâtre, stipe 5 x 1 cm, déprimé, fibrilleux et subconcolore au chapeau.

Chair blanchâtre, odeur faible, saveur douce.

Description microscopique :

Spores 5-7 angles, 8,2-11 x 7-8 μm , Q 1,3



Cheilocystides absentes, basides tétrasporiques 30-45 x 10-12 μm , hyphes du revêtement incrustées, boucles surtout dans l'hyménium, rares ailleurs.



Baside



Hyphe incrustée

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce récoltée par l'auteur le 16 avril 2012, domaine du Maine pommier, commune de Lagorce en Gironde.

De nombreux spécimens sous un petit bosquet de *Pinus pinaster*, sur sol sablonneux, pauvre et acide.

Chorologie :

Espèce peu commune mais largement diffusée, rare en plaine.

Le site Mycocharentes de Patrice Tanchaud signal une récolte en avril 2012 à Soyaux (16) dans une lande à bruyères et ajoncs.



Tricholoma stans (Fr.) Sacc.
Tricholome constant, Tricholome élancé

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau jusqu'à 8 cm, brun-rosé avec la marge plus pâle, peu visqueux et vergeté radialement.

Lames adnées à subémarginées, moyennement espacées, blanches à crème avec un léger reflet rosâtre.

Stipe plutôt élancé, pâle et envahi depuis la base de fibrilles brunâtres.

Chair blanchâtre

Odeur farineuse faible et fugace, saveur subdouce (amarscente à subdouce).



Description microscopique :

Non effectuée sur cette récolte.

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce récoltée par l'auteur le 14 novembre 2011 sur sol sablonneux, sous *Pinus pinaster* et en bordure d'une piste forestière proche de l'étang de Levrault en Charente-Maritime.

Chorologie :

Espèce peu commune que l'on peut trouver sous *Pinus*, *Picea*, *Cedrus*.
(Somme, Vendée, Languedoc, etc.)





Un champignon mortel...

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martin
Lépiote brun-rose

Description macroscopique du spécimen récolté :

Chapeau 5 cm, avec des squames brun rosâtre sur fond crème.

Lames blanches, stipe avec le sommet blanc et recouvert d'écailles brunes à la base avec une zone annulaire brune, de faible texture, en séparation.

Chair blanche ou légèrement vineuse.


Odeur faible de *cristata*



Description microscopique :

Spores 8-9,5 x 4,5-5,5 μm , ellipsoïdes

Poils piléiques allongés 150-300 x 10-15 μm



Spores

Habitat, lieu et date de récolte :

Un seul spécimen récolté par l'auteur le 13 septembre 2011, dans un massif de fleurs à Bignac en Gironde.

Chorologie :

Espèce bien distribuée que l'on peut trouver dans les pelouses, ou à terre sous feuillus mêlés.

Rare, moyennement fréquente ou commune selon les auteurs.

Signalée par exemple par Guy DUPUY (Site MYCOLERON) sur l'île d'Oléron.



Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.
Bolet abricot

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau 3 cm, orangé abricot et pores jaunes peu bleuissants.

Stipe 5 x 1,5 cm, fusiforme, rose en haut et jaune en bas.


Chair jaune, orangée à la base du pied, bleuissant dans le haut du stipe.

FeSO₄ noirâtre dans la chair du pied.



Description microscopique :

Epicutis composé d'hyphes présentant des taches lépreuses visibles dans le rouge congo ammoniacal.



Hyphe

Habitat, lieu et date de récolte :

Une récolte par l'auteur de 2 spécimens le 06/09/2011 à Tizac de Lapouyade (lieu-dit Le Moulin de Charlot) sous feuillus en bordure de rivière en Gironde.

Chorologie :

Cette espèce peu commune (et qui peut être confondue avec d'autres champignons du genre) se rencontre sous feuillus, surtout *Quercus* et *Castanea*, et parfois aussi sous conifères (*Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*). Les milieux ouverts lui sont favorables. Présent dans les lieux thermophiles comportant ces essences.



Autre récolte (Bignac 33)



Xerocomus armeniacus



Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw. : Fr.) Singer

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau 1 cm, blanchâtre, avec une petite papille conique au centre, non hygrophane.

Lames adnées à décurrentes, blanches ou un peu rosâtre.

Stipe pruineux, blanc à base noirâtre.

Odeur et saveur indistinctes.

Description microscopique :

Spores 11-13 x 5-6,5 µm



Spores

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce récoltée par l'auteur en Gironde le 19/07/09 sous *Populus sp.*, sur terre nue souvent inondée par les eaux d'un étang, lieu dit « Etangs des chèvres », Sablons-de-Guîtres.

Chorologie :

Distribution: Rare and wide-spread. Known to occur in Europe and North-America. Summer - Autumn.

Fédération Mycologique de l'Est - dans l'herbe, au bord d'un chemin forestier, fin septembre 2006.

Une récolte à La Grande-Verrière, Saône-et-Loire, le 15/07/12, par Jean-Pierre Dechaume dans une vieille prairie naturelle.

Une récolte signalée par Mycocharentes (Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres, un site de Patrice Tanchaud) en juin 2010 sur le bord d'un chemin aux Vergnes, commune de Ste Gemme.





Références du net

Fédération Mycologique de l'Est - mycofme.free.fr

Mycocharentes - Site de Patrice Tanchaud (www.mycharentes.fr).

MycoDB - Une base de données mycologique interactive (www.mycodb.fr).

Mycoléron - Site de Guy Dupuis (www.mycoleron.fr).

Photos : Pascal MICHEL