

Juillet 2015

Champignons des marges de la Double Saintongeaise


Pascal MICHEL



Marasmiellus tricolor var. *tricolor* (dans le prochain numéro).

Sommaire du numéro 4

Arrhenia griseopallida
Boletus pulverulentus
Gomphidius roseus
Bolbitius coprophilus



En bordure nord du département de la Gironde et voisin de la Charente maritime, les marges de la Double Saintongeaise s'étendent sur une quarantaine de kilomètres d'est en ouest avec une largeur variant de deux à quinze kilomètres. La forêt est bien présente sur ce territoire avec les essences habituelles de la région : *Pinus pinaster*, *Quercus robur*, *Castanea sativa*. Parsemée de nombreuses clairières cultivées elle se voit aujourd'hui de plus en plus réduite par des coupes rases mettant réellement en danger le tissu paysager en certains endroits.



Lieu d'observation de *Arrhenia griseopallida*

Présentation des espèces et écologie

Arrhenia griseopallida (Desm. : Fr.) Watling

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Le chapeau est convexe (jusqu'à 2 cm), peu déprimé, à marge flexueuse, costulée, et à revêtement mat, hygrophane. La couleur va du brun-gris foncé à blanchâtre en séchant.

Lames grises devenant rosâtre, décurrentes, peu serrées et épaisses, fourchues et interveinées, plissées.

Stipe 5 x 1 cm, déprimé, fibrilleux et subconcolore au chapeau.


La chair est blanchâtre, l'odeur faible et la saveur douce.



Sporée

Description microscopique :

Spores : 6,5-9 x 4,5-5,5 µm



Basides : bisporiques et tétrasporiques, environ 30 x 9 µm pour ces dernières.

Boucles +

Hyphes incrustées

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce trouvée début avril 2013, lieu-dit «Étangs des chèvres», à Sablons en Gironde, sur terrain sablonneux en bordure d'une ancienne gravière transformée en étang pour la pêche.

Chorologie :

Calvados, Morbihan, Saône-et-Loire (Mycodb)

Île de Ré (Mycocharentes)



Boletus pulverulentus Opat.

(*Cyanoboletus pulverulentus* (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini, comb.nov.)

Bolet pulvérulent

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau jusqu'à 10 cm, velouté et brunâtre. Les pores sont jaunes et bleuissent fortement, le pied est également jaune et bleuit de la même manière que les pores. La chair jaune montre un intense bleuissement à la coupe, l'odeur est peu remarquable et la saveur douce. On trouve cette espèce sous nos feuillus et conifères sur sol plutôt sablonneux.



Description microscopique :

Non effectuée sur cette récolte.

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce récoltée par l'auteur le 14 novembre 2011 sur sol sablonneux, sous *Pinus pinaster* et en bordure d'une piste forestière proche de l'étang de Levrault en Charente-Maritime.

Chorologie :

Espèce peu commune que l'on peut trouver un peu partout sous *Pinus*, *Picea*, *Cedrus*.



Gomphidius roseus (Fr.) Fr.
Gomphide rose

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau 5 cm, avec des squames brun rosâtre sur fond crème, lames blanches, stipe avec le sommet blanc et recouvert d'écailles brunes à la base avec une zone annulaire brune, de faible texture, en séparation.

La chair est blanche ou légèrement vineuse et l'odeur est faible, un peu de cristata.



Description microscopique :

Non effectuée sur cette récolte.

Habitat, lieu et date de récolte :

Bignac (33), étang de Chamadelle, octobre 2011 et étang de Levrault, Cercoux (17), Novembre 2010.

Chorologie :

Un peu partout en Europe. Cette espèce se rencontre en tandem avec le Bolet des bouviers et en présence de Pins.



Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo

Description macroscopique des spécimens récoltés :

Chapeau visqueux (jusqu'à 6 cm), saumon dans la jeunesse puis devenant blanchâtre avec le centre brun clair. Lames beiges devenant rouille. Pied blanc, pruneux.



Description microscopique :

Non effectuée sur cette récolte.

Habitat, lieu et date de récolte :

Espèce récoltée par l'auteur en Gironde le 01/08/2011 sur de la paille en fermentation avec du crottin de cheval.

Chorologie :

Espèce peu commune semblant se rencontrer un peu partout dès lors que le biotope s'y prête.





Références du web

Fédération Mycologique de l'Est - mycofme.free.fr

Mycocharentes - Site de Patrice Tanchaud (www.mycocharentes.fr).

MycoDB - Une base de données mycologique interactive (www.mycodb.fr).

Mycoléron - Site de Guy Dupuis (www.mycoleron.fr).

Photos : Pascal MICHEL